

SKĀBBARĪBA (pērkot tehniskos pakalpojumus)

NEL = 5,63 MJ/kg saunas	Mēr-	1. gads (ierīkošana)			2.–5. gads (rituli)			2.–5. gads (stirpas)		
1 kg skābbarība = 0,32 kg saunas	vienība	Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR	Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR	Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR
IEŅĒMUMI										
Virsaugs (viengadīgā aīrene)	t	15								
Skābbarība (ņemot vērā zudumus)	t				20			22		
NEL (neto enerģija laktācijai)	MJ	27 024			36 032			39 635		
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Sēkla virsaugam (ierīkošanai 15 kg/ha)	kg	15	2,10	31,50						
Sēkla (ierīkošanai 25 kg/ha)	kg	25	5,80	145,00						
Mēslojums:										
Tīrvielā	kg		N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (130:31:229)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (130:31:229)			N:P ₂ O ₅ :K ₂ O (130:31:229)	
Šķīdumēsli (digestāts)	t	40	1,50	60,00	40	1,50	60,00	40	1,50	60,00
Kālija hlorīds	kg	250	0,41	102,50	250	0,41	102,50	250	0,41	102,50
Amonija sulfāts	kg	200	0,36	72,00	200	0,36	72,00	200	0,36	72,00
Plēve (8 m plata)	m							2,31	2,65	6,12
Konservants	l									55,00
KOPĀ uz 1 ha (1)				411,00			174,50			235,62
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Šķīdumēsļu izkliešana	t	40	4,10	164,00	40	4,10	164,00	40	4,10	164,00
Minerālmēsļu izkliešana	reizes	3	21,00	63,00	3	21,00	63,00	3	21,00	63,00
Kultivēšana	reizes	1	37,52	37,52						
Pļevēšana	reizes	1	22,70	22,70						
Sēšana	reizes	1	44,20	44,20						
Zāles pļaušana	reizes	2	46,81	93,62	3	46,81	140,43	3	46,81	140,43
Zāles ārdīšana/vālošana	reizes				3	31,48	94,44	3	31,48	94,44
Presēšana rituļos (ieskaitot plēvi)	reizes	2	153,00	306,00	3	136,00	408,00			
Zāles smalcināšana, transports	reizes							3	55,00	165,00
Ecēšana	reizes				1	26,90	26,90	1	26,90	26,90
Šķīvošana	reizes	1	44,72	44,72						
Aršana	reizes	1	65,04	65,04						
Masas blietēšana	h							1,32	50,00	66,00
KOPĀ (2)				840,80			896,77			555,77
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (3=1+2)				1251,80			1071,27			791,39
MAINĪGĀS IZMAKSAS 1 uz 1 kg			0,015	0,027		0,005	0,009		0,006	0,011
MAINĪGĀS IZMAKSAS 2 uz 1 kg			0,031	0,083		0,025	0,054		0,014	0,036
ATBALSTS										
Ilgspēju sekmējošais ienākumu pamatatlbalsts (ISIP)				80,86			80,86			80,86
Zālāju saglabāšanas veicināšana (EKO6)				49,00			49,00			49,00
KOPĀ				129,86			129,86			129,86
MAINĪGĀS IZMAKSAS 3 uz 1 kg			0,046	0,075		0,030	0,047		0,020	0,030

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC augkopības konsultantes Ievas Kamerādes-Sniedzes un lauku saimniecību sniegtie dati.

Izstrādātais skābbarības bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas saskaņā ar ekspertu viedokli ir jāpieņem, lai šādos apstākļos iegūtu konkrētu ražību.

Bruto segums sastādīts zālei, kas paredzēta skābbarības sagatavošanai un kas audzēta augsnē ar vidēju P un K nodrošinājumu. Augsnes skābums pH 6,0–7,0%, trūdvielu saturs augsnē 2,0–2,5%.

Zālās tiek ierīkoti uz pieciem gadiem. Sēklas maisījumā ietilpst sarkanais ābolīns, ganību aīrene, timotiņš un pļavas auzene. Ja zāli noplauj savlaicīgi un ir atbilstoši laika apstākļi, tad ir iespējams iegūt 2. un pat 3. plāvumu. Ierīkošanas gadā tiek pieņemts, ka zāli izmanto zālbarības sagatavošanai.

Aprēķinot pļēves daudzumu, tiek pieņemts, ka 500 t tranšējas noseģšanai ir nepieciešami 52,5 m pļēves ar platumu 8 m.

Sēklas maisījuma un virsauga sēklas izšējas daudzums izvēlēts pēc ekspertu ieteikuma. Mēslojuma daudzums izvēlēts tāds, lai sasniegtu optimālo ražas līmeni.

Visi nepieciešamie pakalpojumi tiek iegādāti no tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, un to cenas ņemtas no LLKC apkopotajām tehnisko pakalpojumu vidējām cenām 2024. gadā. Aprēķinot masas blietēšanas ilgumu, tiek pieņemts, ka 500 t tranšējas blietēšanai ir nepieciešamas aptuveni 30 stundas. Sagatavojot skābbarību rituļos, ir pieņemts, ka atāls tiek noganīts. Skābbarību vidēji transportē pa 4,8 t (mazās piekabēs, t. sk. graudu piekabēs) vai pa 14,4 t (lielās piekabēs).

Katrā saimniecībā saņemtie atbalsta veidi un lielumi attiecīgām kultūraugam var atšķirties, jo saimniecība konkrēto platību var arī nepieteikt atbalsta saņemšanai. Atbalsta veidi un likmes norādītas atbilstoši 2024. gadam.

Sastādītais bruto segums pamatojas uz ilggadīgu audzēšanas pieredzi, bet to nevar uzskatīt par universālu un kategorisku. Katrā konkrētajā gadījumā ir jāveic korekcijas atbilstoši saimniekošanas tehnoloģijai un apstākļiem (augšnes auglība, iekultivētības pakāpe, nezāļainība, cenas u. c.).